

# 新型コロナワクチン接種後の副反応への対応方法

2023年11月17日

ファイザー社、モデルナ社、武田社(ノババックス)のワクチンについて



## 症状が出た時の対応


- 新型コロナワクチンは、非常に高い効果があります。一方で、接種後に体内で免疫ができる過程で、接種部位の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等の症状が現れることがあります。

### 【発熱や痛み】

- 市販の解熱鎮痛薬(アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬 [イブプロフェンやロキソプロフェン等])で対応いただけます。
- 発熱時には、水分を十分に摂取することをお勧めします。
- 5歳から11歳の小児、生後6か月から4歳の乳幼児に関しても同様です。
- 妊娠・授乳中の方や胃潰瘍・腎機能障害・喘息などの持病のある方は、薬剤師や医師にご相談ください。

### 調査対象が使用した薬剤

アセトアミノフェン アスピリン  
ロキソプロフェン イブプロフェン  
ジクロフェナク



### 【かゆみや発赤】

- かゆい場合は冷やしたり、抗ヒスタミン剤やステロイドの外用薬(軟膏等)を塗ると、症状が軽くなります。こうした成分は、市販の虫刺されの薬などにも含まれています。
- ※症状が重い場合、長引く場合は、医療機関等への受診や相談をご検討ください。


## 副反応に関するご相談

- ワクチン接種後、副反応を疑う症状で医療機関を受診したい場合、まずは身近な医療機関や、ご自身が接種を受けた医療機関で診ていただくことになります。各都道府県にも、副反応に関する相談窓口等の設置をお願いしていますので、ご相談の際は、お住まいの都道府県のワクチンに関する窓口にお問合せください。



## 接種後の生活

- ワクチンの効果は高いですが、100%ではありません。ウイルスの変異による影響もありえます。接種後も、効果的な感染予防対策の継続をお願いいたします。



## 接種後に起こる可能性のある症状(副反応)




- 厚生労働省では、国内数万人を対象に、新型コロナワクチン接種後の健康状況調査を実施しており、その調査結果から、症状の経過等の概要をご報告します。次ページをご参照ください。



# 接種後の症状の経過・頻度




いずれの症状も、大部分は接種の翌日をピークに発現し、数日以内に回復しました。

ファイザー社オミクロン株対応  
2価ワクチン追加接種後  
(令和4年秋開始接種)






※エラーバーは母比率の95%信頼区間 ※人数は調査対象者の数

ファイザー社オミクロン株対応  
2価ワクチン追加接種後  
(令和5年春開始接種)






※エラーバーは母比率の95%信頼区間 ※人数は調査対象者の数

モデルナ社オミクロン株対応  
2価ワクチン追加接種後  
(令和4年秋開始接種)



※エラーバーは母比率の95%信頼区間 ※人数は調査対象者の数

モデルナ社オミクロン株対応  
2価ワクチン追加接種後  
(令和5年春開始接種)






※エラーバーは母比率の95%信頼区間 ※人数は調査対象者の数

(※)症状の経過等については、健康状況調査(新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業)の中間報告を基に記述しており、ファイザー社、モデルナ社ともに令和5年10月27日報告分です。なお令和5年秋開始接種で使用されるワクチンの安全性も、これまでのワクチンと同様、特段の懸念は認められていません。詳しい情報は厚生労働省ホームページをご参照ください。

## 接種後の症状の経過・頻度




ファイザー社の5歳から11歳用ワクチンについても、主な副反応として、注射した部分の痛み、頭痛、疲労、発熱等があります。

ファイザー社オミクロン株対応  
2価ワクチン  
(5歳～11歳用)追加接種後



※ファイザー社オミクロン株対応2価ワクチン5歳～11歳用は少数例のためエラーバーは省略 ※人数は調査対象者の数

武田社のワクチン  
(ノババックス)  
追加接種(4回目以降)後



※エラーバーは母比率の95%信頼区間 ※人数は調査対象者の数

(※)症状の経過等については、健康状況調査(新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業)の中間報告を基に記述しており、ファイザー社(5歳～11歳用)、武田社(ノババックス)ともに令和5年10月27日報告分です。なお令和5年秋開始接種で使用されるワクチンの安全性も、これまでのワクチンと同様、特段の懸念は認められていません。詳しい情報は厚生労働省ホームページをご参照ください。



健康状況調査

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine\\_kenkoujoukyoutyousa\\_xbb.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkoujoukyoutyousa_xbb.html)



副反応への対応方法(動画)

<https://www.youtube.com/watch?v=win66w5Zl8k>



ひと、暮らし、みらいのために

厚生労働省  
Ministry of Health, Labour and Welfare